

療法名	薬剤	投与量	投与時間	施行日	投与間隔	催吐リスク
TP	パクリタキセル	67.5mg/m ² ×2	12時間×2	d1	21日	高
	ランダ	50mg/m ²	2時間	d2		
CDDP(CCRT)	ランダ	40mg/m ²	1時間	d1	1日	高
TP+Bmab	パクリタキセル	67.5mg/m ² ×2	12時間×2	d1	21日	高
	ランダ	50mg/m ²	2時間	d2		
	アバスチン	15mg/kg	初回 90分 2回目 60分 3回目以降 30分	d2		
CPT-11+NDP	カンプト	60mg/m ²	90分	d1	28日	高
	アクプラ	80mg/m ²	1時間	d1		
TC	パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	d1	21日	高
	カルボプラチン	AUC 5	1時間	d1		
TC+Bmab	アバスチン	15mg/kg	初回 90分 2回目 60分 3回目以降 30分	d1	21日	高
	パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	d1		
	カルボプラチン	AUC 5	1時間	d1		
キイトルーダ+TC+Bmab	キイトルーダ	200mg/body	30分	d1	21日	高
	アバスチン	15mg/kg	初回 90分 2回目 60分 3回目以降 30分	d1		
	パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	d1		
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	1時間	d1		
	Bmab	アバスチン	15mg/kg	初回 90分 2回目 60分 3回目以降 30分	d1	21日
キイトルーダ+Bmab	キイトルーダ	200mg/body	30分	d1	21日	—
	アバスチン	15mg/kg	初回 90分 2回目 60分 3回目以降 30分	d1		
リブタヨ	リブタヨ	350mg/body	30分	d1	21日	—