

| がん種 | 療法名 | 薬剤 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 投与間隔 | 催吐リスク |
|-------|---------------------|----------|--------------------------|------|---------|------------|-------|
| 尿路上皮癌 | GC | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 30分 | d1,8 | 21日 | 高 |
| | | ランダ | 70mg/m ² | 2時間 | d1 | | |
| 尿路上皮癌 | GC(short hydration) | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 30分 | d1,8 | 21日 | 高 |
| | | ランダ | 70mg/m ² | 2時間 | d1 | | |
| 尿路上皮癌 | GC Split | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 30分 | d1,8 | 21日 | 高 |
| | | ランダ | 35mg/m ² | 2時間 | d1,8 | | |
| 尿路上皮癌 | ddM-VAC | メソトレキセート | 30mg/m ² | 30分 | d1 | 14日 | 高 |
| | | アドリアシン | 30mg/m ² | 全開 | d2 | | |
| | | エグザール | 3mg/m ² | 全開 | d2 | | |
| | | ランダ | 70mg/m ² | 2時間 | d2 | | |
| 尿路上皮癌 | オブジーボ | オブジーボ | 240mg/body 480mg/body | 30分 | d1 | 14日 28日 | - |
| 尿路上皮癌 | キイトルーダ | キイトルーダ | 200mg/body 400mg/body | 30分 | d1 | 21日 42日 | - |
| 尿路上皮癌 | バベンチオ | バベンチオ | 10mg/kg | 1時間 | d1 | 14日 | - |
| 尿路上皮癌 | パドセブ | パドセブ | 1.25mg/kg | 30分 | d1,8,15 | 28日 | - |
| 尿路上皮癌 | ピノルビン(膀胱注) | ピノルビン | 30mg/body | | | | - |