

がん種	療法名	薬剤	投与量	投与時間	施行日	投与間隔	催吐リスク
胆道癌	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	d1,8,15	28日	軽
胆道癌	GEM+CDDP	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	d1,8	21日	高
		ランダ	25mg/m ²	1時間	d1,8		
胆道癌	GEM+S-1	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	d1,8	21日	軽
		TS-1	60mg/m ²	1日2回 内服	d1-14		
胆道癌	GEM+CDDP+S-1	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	d1	14日	高
		ランダ	25mg/m ²	1時間	d1		
		TS-1	60mg/m ²	1日2回 内服	d1-7		
胆道癌	イミフィンジ+GEM+CDDP	イミフィンジ	1500mg/body	1時間	d1	21日	高
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	d1,8		
		ランダ	25mg/m ²	1時間	d1,8		
胆道癌	イミフィンジ(維持)	イミフィンジ	1500mg/body	1時間	d1	28日	-
胆道癌	キイトルーダ MSI-High	キイトルーダ	200mg/body 400mg/body	30分	d1	21日 42日	-