

がん種	療法名	薬剤	投与量	投与時間	施行日	投与間隔	催吐リスク
膵臓癌	FOLFIRINOX	エルプラット	85mg/m ²	2時間	d1	14日	中
		カンプト	180mg/m ²	90分	d1		
		レボホリナート	200mg/m ²	90分	d1		
		5-FU	400mg/m ²	全開	d1		
			2400mg/m ²	46時間	d1-2		
膵臓癌	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	d1,8,15	28日	軽
膵臓癌	GEM+S-1	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	d1,8	21日	軽
		TS-1	80mg/m ²	1日2回内服	d1-14		
膵臓癌	GEM+nab-PTX	アブラキサン	125mg/m ²	30分	d1,8,15	28日	軽
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	d1,8,15		
膵臓癌	mFOLFIRINOX	エルプラット	85mg/m ²	2時間	d1	14日	中
		カンプト	150mg/m ²	90分	d1		
		レボホリナート	200mg/m ²	90分	d1		
		5-FU	2400mg/m ²	46時間	d1-2		
膵臓癌	オニバイド+FL(50mg/m ²)	オニバイド	50mg/m ²	90分	d1	14日	中
		レボホリナート	200mg/m ²	2時間	d1		
		5-FU	2400mg/m ²	46時間	d1-2		
膵臓癌	オニバイド+FL(70mg/m ²)	オニバイド	70mg/m ²	90分	d1	14日	中
		レボホリナート	200mg/m ²	2時間	d1		
		5-FU	2400mg/m ²	46時間	d1-2		
膵臓癌	キイトルーダ MSI-High	キイトルーダ	200mg/body 400mg/body	30分	d1	21日 42日	-
膵臓癌	ザノサー Weekly	ザノサー	1000mg/m ²	30分	d1	7日	高