

がん種	療法名	薬剤	投与量	投与時間	施行日	投与間隔	催吐リスク
頭頸部癌	CDDP+RT	ランダ	100mg/m ²	2時間	d1	21日	高
頭頸部癌	wPTX	パクリタキセル	100mg/m ²	1時間	d1,8,15, 22,29,36	49日	軽
頭頸部癌	Cmab+CDDP+5-FU	アービタックス ランダ 5-FU	初回400mg/m ² 2回目以降 250mg/m ² 100mg/m ² 1000mg/m ²	初回2時間 2回目以降 1時間 2時間 24時間	d1,8,15 d1 d1-4	21日	高
頭頸部癌	Cmab+PTX	アービタックス パクリタキセル	初回400mg/m ² 2回目以降 250mg/m ² 80mg/m ²	初回2時間 2回目以降 1時間 1時間	d1 d1	7日	軽
頭頸部癌	Cmab+PTX+CBDCA	アービタックス パクリタキセル カルボプラチン	初回400mg/m ² 2回目以降 250mg/m ² 80mg/m ² AUC 2.5	初回2時間 2回目以降 1時間 1時間 1時間	d1,8,15 d1,8 d1,8	21日	高
頭頸部癌	Cmab+RT	アービタックス	初回400mg/m ² 2回目以降 250mg/m ²	初回2時間 2回目以降 1時間	d1	7日	-
頭頸部癌	オブジーボ	オブジーボ	240mg/body 480mg/body	30分	d1	14日 28日	-
頭頸部癌	キイトルーダ	キイトルーダ	200mg/body 400mg/body	30分	d1	21日 42日	-
頭頸部癌	キイトルーダ+CBDCA+5-FU	キイトルーダ カルボプラチン 5-FU	200mg/body AUC 5 800mg/m ²	30分 1時間 24時間	d1 d1,8 d1-4	21日	高